

*„Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot.”*

*/Mahatma Gandhi/*

# DROG

- Minden olyan kémiai anyag, amely módosítja az agytevékenységeket valamelyik élettörténetet is, valamint lelki (pszichikai) vagy fizikai függőséget (dependenciát) okoz.

*Lelki függőség* = sóvárgás, az iránti kínzó vágy.

*Fizikai függőség:* a létfenntartásért felelős vegetatív idegrendszer is csak az adott anyag jelenlétében tud működni. A drog hiányában a test működése rendezetlenné, abnormálissá válik, anyagcsere/légzési zavarok léphetnek fel.

# Miért ?

- Kíváncsiság.
- Családi minta.
- Családi/iskolai/  
munkahelyi problémák,  
nyomás.
- Felnőttek/  
vagánynak tűnni.
- Felelőtlenség.
- Korcsoporti nyomás  
/hierarchiában betöltött pozíció  
elnyerése.
- Unatkozás.
- Rossz konfliktuskezelés.
- Gátlásoldás.
- Mert könnyen elérhető...

# Szenvedélybetegség

- Alkohol
- Dohányzás
- Gyógyszer
- Koffein, teofilin, teobromin, csokoládé (kóla, kávé, tea, energiatital)
- Szerencsejáték
- Egyes sporttevékenység (különösen a testépítés)
- Internet (chat, on-line-játék, társkereső...)
- Számítógépes játékok
- Televízió
- Vásárlás (boltkór)
- Evés (anorexia, bulémia, örömevés, éjszakai evés, drunkorexia – bulizó fiatal csak alkoholt iszik, semmi szilárd, ortorexia-diétázásról leszokni képtelenség)

## Kábítószer

# Kábítószer

## *Tünetek*

### Pszichés tünetek:

- feldobottság, illúziók, hallucinációk,
- idegesség, ingerlékenység, szorongás,
- depresszió, érdektelenség, pesszimizmus,
- ok nélküli öröm/dühkitörés,
- hiperérzékenység,
- tudatzavar,
- figyelem és koncentráció képesség zavara, feledékenység,
- teljesítőképesség változásai,
- alvászavar,
- időbeli/térbeli koordináció zavara,
- túl sok, gyakran logikátlan beszéd,
- indokolatlan félelem/pánikérvzés.

# Kábítószer

## *Tünetek*

### **Testi tünetek:**

- beesett, szürkés arcszín, arcbőr elszíneződése,
- mély szemgödör, véreres szemek,
- ismeretlen eredetű tüsszúrások, sebek, véraláfutások,
- szűk/tág pupilla,
- szájszárazság, orrfolyás,
- étvágytalanság, erős fogyás,
- gyomor-, bélműködési zavarok,
- túlzott érzékenység külső ingerekre (fény, zaj, fájdalom)
- szokatlan izzadás, libabőr, remegés,
- bőrviszketés.

# Kábítószer

## *Tünetek*

### **Magatartásbeli változások:**

- kimaradozás, iskolakerülés,
- tanulmányi eredmény romlása,
- családon belüli kapcsolatok romlása,
- zárkózottság,
- új baráti kör titkolása,
- elmagányosodás,
- elfordulás korábbi barátoktól, hobbitól,
- túlzott költekezés, kölcsönkérés,
- pénz és egyéb érték eltűnése a környezetéből,
- ismeretlen eredetű pénzösszegek megjelenése,
- étkezési/alvási zavarok,
- elhanyagoltság, ápolatlanság, ugyanakkor mértéktelen illatszerhasználat (elnyomja a drogok szagát)
- agresszív magatartás.

# Kábítószer használatának tünetei – dizájner drogok

## A szer hatása alatt:


- kiszámíthatatlan emberi reakció,
- környezeti hatásokat nem érzékeli,
- nincs fájdalomérzet,
- rendkívüli agresszivitás,
- fizikai erő megsokszorozódik,
- szívfrekvencia kritikus szintre emelkedik,
- melegségérzet – ruhát leveszik.



# Kábítószer

## *Történelem*

- Az emberiséggel egyidős kultúrák, sámáni szertartások: mák, kender, gomba, kokacserje – varázserő, látnoki képesség.
- Zeusz olümposzi szeánszain - ambrózia.
- Hérodotosz i.e. 450: szkíták és trákok kendert termesztettek a kábulat előidézésére.
- Ókori Róma: drogkereskedelem – a Földközi tengerből 1969-ben kiemelt pun hadigályán 2 db hasissal telt amfórát találtak.
- Peyote kaktusz, gomba – indiánok.
- 1805. – mákból kivont alkaloid: morfin.
- XIX. század – kokacserje, Coca-Cola.
- 1938. Albert Hofmann – LSD.
- 1938. II. világháború – amfetamin.
- XX. század térhódítás.
- Dizájner drogok.



NASA-kutatók pókokat különböző drogokkal kezeltek, majd megnézték, milyen hálót szőnek ezután. Változatos kreációk születtek, amiknek nem sok közül volt az eredeti légyfogó berendezéshez:

**Az extasy-val vagy speeddel tuningolt pókok** vad dolgokat kreáltak, a háló keretében sok lyukat hagytak.

**LSD:** egyenletesen szőttek, de nem teljesen fejezték be a művüket.

**Marihuana:** úgy tűnt, a pókok elvesztették a kedvüket munka közben, félbehagyták a hálót

**Clorahidrát (altatók):** a keret még elkészült, de a körökhöz még hozzá se kezdtek.

A **koffeinnek** tudható be a legbizarrabb hatás: a pókok minden tervszerűség nélkül csupán egymáshoz kötögették a szálakat.

# Majdnem kábítószerek

- Kőrishogár
- Galócák – párdac galóca, légyölő galóca
- Látnokzsálya
- Csattanó maszlag
- Hortenzia
- Hajnalka
- Vérehulló fecskefű
- Angyaltrombita
- Szegfűszeg

# Szerves oldószer

*ragi, szipu, pálma...*

- Csavarlazító, jégoldó, festékhígító, lakk, zománcfesték, ragasztó, öngyújtógáz, körömlakk, aceton... zacskó.
- Agyba kerülve kábító/hallucinogén hatás. Melegségérzet, lebegés, „repülni tudás”. Máj, vese, lép roncsolása. Izomgyengeség, kimerültség, rossz közérzet, hányinger, alhasi fájdalom, zavarodottság, remegés, reszketés, viszketés, idegyulladás, idegbénulás.
- Szipuzás, kéjgáz (nevetőgáz)

# Krokodil Lab







## **Marihuána**

*fű, joint, rakéta, gyep, spangli, marcsi,  
gandzsa*

- Vadkender, rost/ipari kender, cannabis sativa var. indica;
- THC 9- delta-tetrahydro-cannabinol;
- India, Pakisztán, Nepál;
- Fogyasztás: cigibe sodorva (joint), (v ízi)pipa, hasisevés (Hollandia)
- „Csak” pszichikai függés.

# Marihuána

*fű, joint, rakéta, gyep, spangli, marcsi,  
gandzsa*

## Veszélyei:

- Belépő drog-e? (Nem, mert nem biztos, hogy áttér a keményebb drogokra. Igen, mert a „kemény” drogfogyasztók 99%-a cannabis származékkal kezdte a drogos karrierjét.)
- Folyamatos és ok nélküli vihogás, röhögés.
- Torzul a tér-, és időérzékelés.
- Színek, minták, formák felerősödnek esetleg jelentéssel bíró objektummá válnak.
- Sérül a rövid távú memória, csökken a koncentrálókéesség – mondat közepén elfelejti, mit akart mondani.



# Kokain

*kokó, kocsz, hó, kóla, rög, fehér*

## Veszélyei:

- légzési zavar;
- túladagolás: kóma, halál;
- orrnyálkahártya kisebenedés (szippantás);
- vese/májfunkciók csökkenése;
- keringési zavar;
- intravénás használat: vérmérgezés, vérrög, vénagyulladás, fekély, tályog, Hepatitis B/C/D, AIDS (HepatitisC elterjedése 30% alatt marad – kicsi az esélye az AIDS-nek.)
- paranoias tünetek, eufória – mély depresszió – újabb adag az eufóriához;
- fokozott ingerlékenység, fokozott libidó;
- **SÚLYOS TESTI + PSZICHÉS FÜGGŐSÉG;**

# Ópiátok

*op, M, hercsi, hernyó, mák, tea, csája*

- Az ópium a máknövény (*papaver somniferum*) tejnedve, melyet az éretlen mákfejek bemetszésével nyernek. A fehér színű, folyékony tejnedv a levegő hatására megbarnul.
- India, Pakisztán, Nepál, Irán.
- Étkezési mák és ópiummák (gyógyászati-köhögés/fájdalomcsillapítás, nyugtató).
- 973 – ópiumfüggőség fogalma (Al-Biruni)
- 1805 – kivonták a mákból a hatóanyagot = morfium (Morpheus, az álom görög istene).

# Ópiátok

*op, M, hercsi, hernyó, mák, tea, csája*

- Legősibb/legolcsóbb ópium: máktea (= mákony).
- Heroin: 4x-5x „beütik”=higítják szőlőcukorral, tejjel, kininnel. (Aranylövés)
- Intravénásan v. szippantják.
- Rendkívül erős fizikai ÉS pszichés függés.
- Vér – agyban nagy koncentráció – általános melegérzet, a mámoros állapot mindössze 45 mp-ig!, melyet eufória, majd végtelen nyugalom, álmoság követ.
- 2010-ben gyakorlatilag eltűnt az utcáról – prekursorából (előanyag) sokat lefoglaltak.

# Ópiátok

*op, M, hercsi, hernyó, mák, tea, csája*

## Veszélyei:

- Túladagolás: keringési, légzési zavarok, halál.
- Vitamin és kalciumhiány.
- Gyomor-és bélműködési zavarok.
- Májfunkció csökkenés.
- Intravénás használat: vérmérgezés, vénagyulladás, vérrög, fekély, tályog, Hepatitis B/C/D, AIDS (HepatitisC elterjedése 30% alatt marad – kicsi az esélye az AIDS-nek.)
- Súlyos testi- ÉS lelki függés.

## Is she a heroine?

Rosana Holland 29 évesen kezdte a heroin-fogyasztást, 38 éves korára a felismerhetetlenségig eltorzult

„Amit a drog a külsővel tesz, eltörpül amellet, ami a heroin hatására az ember belsejével történik” (heroinfüggők vélekedése)



## Gombák, kaktuszok

*peyote, psilocybe, meszkalin, légyölő galóca,  
csattanó maszlag*

- Hallucinogének.
- 3000 évvel ezelőtt – sziklarajzok.
- Fogyasztásuk szertartás keretében történt – sámánok szellemidézésnél.
- Nálunk légyölő galóca: szibériai sámánok használták, népvándorlással jutott ide. Egy darab gomba képes kiírtani egy egész családot.

# LSD

Az LSD-t kezdetben alkoholisták és skizofrének pszichiátriai kezelésére alkalmazták, de a kezelések csődöt mondtak, mivel a betegeknél:

- erős hallucináció* (álló objektumok remegni, mozogni kezdenek, a személy saját magát látja kívülről, amint beszél, járkal, fekszik..., nem létező hangokat, zörejeket hall, torzul az ízlelési és szaglási érzékelés)
- személyiségmódosulás* (a pók a szer hatása alatt össze-vissza szötte a hálóját, a macskát pedig páni félelem kerítette hatalmába az egér láttán) alakult ki.

# LSD

## Veszélyei:

- Lappangó pszichés betegségek felszínre törhetnek: skizofrénia, paranoia, pánikbetegség, halálfélelem.
- Ön-és közveszélyes magatartás (kiugrik az ablakon – repülni tud).
- „Flashback”, Bad Tripp.
- Vese kiválasztás, májfunkció csökkenése és lassulása.
- Lelki függőség.



# Speed

*gyors, gyros, gonzalesz, gonzi, spuri, sebesség)*

---

- Az amfetamint a '30-as években hozták forgalomba Európában.
- '50-es évek: antidepresszáns.
- II. világháborúban a katonaság alkalmazta.
- Disco és party drog: felpörget, álmatlanságot elűzi, kitartó fizikai erő (vizsgára készülő diákok, fogyni vágyók, kamionsofőrök) - ma (2014.) is jelen van.

# Speed

*gyors, gyros, gonzalesz, gonzi, spuri, sebesség*

## Veszélyei:

- Túladagolás: keringési zavar, túlhevülés, kezelhetetlenül magas vérnyomás, légzési nehézség, kóma, halál.
- Vesekiválasztás/májfunkciók csökkenése, lelassulása, mellékvese károsodás, kiszáradás.
- Intravénás használat: vérmérgezés, vénagyulladás, vérrögképződés, fekély, tályog, Hepatitis B/C/D, AIDS (HepatitisC elterjedése 30% alatt marad – kicsi az esélye az AIDS-nek).
- Pánikroham, szorongás, téveszmés/üldözési roham – bogarak a bőr alatt- kivakarja, pattanások, hegek az arcon.
- Lelki függőség.

# Ecstasy

*ex, x, bogyó, + az ábrák: dollár, napocska, hógolyó, smile ...*

## Veszélyei:

- Túladagolás: keringési zavar, túlhevülés, kezelhetetlenül magas vérnyomás, légzési nehézség, kóma, halál.
- Vesekiválasztás/májfunkciók csökkenése, lelassulása, mellékvese károsodás, kiszáradás.
- Intravénás használat: vérmérgezés, vénagyulladás, vérrögképződés, fekély, tályog, Hepatitis B/C/D, AIDS (HepatitisC elterjedése 30% alatt marad – kicsi az esélye az AIDS-nek).
- Pánikroham, szorongás, téveszmés rohamok.
- Lelki függőség.
- 2009-ben eltűnt, mert a prekursorokat nem lehetett előállítani. Techno és rave korszak után ugyan csökkent, de kezd visszatérni (MDMA).

# Mephedron

*Kati, Zsuzsi, 4-MMC*

- Növényvédő-szer, porszívó illatosító.
- Stimuláns party drog.
- Heroinisták elkezdtek szúrni magukba, de míg a heroint napi max.4-szer, addig ezeket 12-szer vagy 24-szer szúrták, mert gyors volt a hatása.
- 2011. január 01-én betiltották.
- Megjelenési formái: bogyó, por, folyadék.

# Mephedron

*Kati, Zsuzsi, 4-MMC*

## Veszélyei:

- kis adagban kellemes közérzet ugyan, amelyet aztán fokozódó eufória, izgalmi állapot, nyugtalanság követ;
- beszédkényszer, túlzott nyitottság;
- erőszakos cselekmény vagy öncsonkítás;
- orrvérzés, erős székelési inger;
- paranoia, hallucináció, depresszió;
- ingerlékenység, szapora szívverés, keringési zavar, izzadás, fogcsikorgatás, hirtelen szívhalál;
- koncentrációképesség zavara, rövid távú;
- memória zavara.

## GBL → GHB

- A gamma-butirolakton (GBL) a szervezetbe jutva átalakul gamma-hydroxybutyrate-vá (GHB). (Kis mennyiségben a szervezetben is jelen van.)
- '60-as évek – altatás.
- '80-as évek – testépítők + alvászavarral küzdők.
- Színtelen, szagtalan, teljesen íztelen.

# Gina

- SZEXUÁLIS ERŐSZAK / RANDIDROG
- Akaratnyilvánításra és védekezésre képtelen állapot.
- „Bár harcolnál, marnál, karmolnál és harapnál – mozdulatlan maradsz.”

# GBL → GHB

## Hatása:

- Bevétel után 10-20 perc;
- 45 perctől 1,5 óráig teljes erővel hat a szer;
- Utóhatások: 2-4 nap;
- Alacsony dózis: növeli a relaxációs képességet, csökkenti az antiszociális hajlamokat, hangulati ingadozást, enyhén becsípettnek érzi magát. Fogékonyabbá válik a zene iránt, tánckedv, beszédingere megnő.
- Szédülés, látászavar, alvászavar, émelygés, tántorgás, kásás beszéd, tériszonyoszerű szédülés, tudatvesztés, rángatózás.
- Légzészavar, kómaszerű állapot.



## Dizájner drogok = orosz rulett

Jóval olcsóbbak és sokáig büntetőjogi kockázata sem volt, könnyen előállíthatók.

- Methylon (BK-MDMA).
- Szintetikus cannabinoid (JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-210), spice. (2011-2013.)
- Four-mec (4-MEC).
- 4 fluoramfetamin (4-FA, 4FMP, PFA)
- Benzo fury (6-APB).
- Para-metil-4-metilaminorex: több haláleset tavaly. Júniusban megjelent, szeptemberre C listás lett. (Boncoláskor mindenhol és mindene vérzett.)
- 2014. nyár. ABC-chminaca (hatóanyagokkal átítatott növényi anyag) ZENE, ÉVI
- 
-

# **Büntető törvénykönyv**

---

**Kábítószer kereskedelem**

**Kábítószer birtoklása**

**Kóros szenvedélykeltés**

**Új pszichoaktív anyaggal visszaélés**

**Teljesítményfokozó szerrel visszaélés**

## Btk. 176. §. Kábítószer-kereskedelem

- *176. § (1) Aki kábítószeret kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, büntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.*
- *(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt*
  - *a) bünszövetségben,*
- *(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.*
- *(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.*
- *(5) Aki csekély mennyiségű kábítószeret kínál vagy átad,*
  - *a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig,*
  - *b) a (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.*
- *(6) Aki*
  - *a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, három évig,*

## **Btk. 177. §. (1) 18. életévét betöltött személy, aki**

- *a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószerrel kínál, átad,*
- *b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószerrel forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,*
- *c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószerrel*
  - *ca) kínál, átad,*
  - *cb) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,*
- *büntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.*

## Btk. 178. §. Kábítószer birtoklása

- **Aki kábítószerrel természet, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, büntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.**
- (2) A büntetés
- *a)* két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
- *aa)* üzletszerűen,
- *ab)* bűnszövetségben,

## Btk. 184. §.

### Új pszichoaktív anyaggal visszaélés

- Aki új pszichoaktív anyagot kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntett miatt **egy évtől öt évig** terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
- (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
  - *a)* bűnszövetségben,

## Diverzió, azaz elterelés

Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószer saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószer fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.

Az (1) bekezdés **nem alkalmazható**, ha a bűncselekmény elkövetését megelőzően két éven belül az elkövetővel szemben a vádemelést azért halasztották el, illetve a nyomozást vagy az eljárást azért függesztették fel, mert vállalta a kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt, vagy az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószerkereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították.

A 178. § (1) és (5)-(6) bekezdés, illetve a 179. § (1)-(2) és (6) bekezdés esetén - ha az (1) bekezdés nem alkalmazható - a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószer értékesítő személy

kilétének megállapítását.

A spiral-bound notebook with a brown cover and a cream-colored page. The spiral binding is on the left side. The page is mostly blank, with a horizontal line near the top. The text "Köszönöm a megtisztelő figyelmet!" is centered on the page.

**Köszönöm a megtisztelő figyelmet!**